CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **04**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut. MED.01-04-22.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2020

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas przyjęcia pacjentki, u której zaplanowano zabieg opracowania ubytku i założenia wypełnienia stałego.

Przygotuj w pojemniku dezynfekcyjnym 2 litry roztworu do dużych narzędzi zgodnie z dołączoną *Ulotką środka dezynfekcyjnego ID 212,* a w osobnym pojemniku dowolny preparat do dezynfekcji narzędzi obrotowych. Wykonaj obliczenia ilości składników roztworu dezynfekcyjnego na zamieszczonym w arkuszu druku. Wypełnij *Metryczkę na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi*.

UWAGA – *Gotowość do przygotowania preparatów dezynfekcyjnych zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj zadanie.*

W oparciu o informacje zawarte w *Poleceniach lekarza dentysty* i *Ulotce materiału Riva Self Cure* przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty, skompletuj niezbędne materiały, sprzęt i narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.
Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych znajduje się na STANOWISKU POKAZU.

UWAGA – *Przygotowane stanowisko zgłoś do oceny przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora przejdź do STANOWISKA POKAZU i przygotuj kapsułkowany materiał glassjonomerowy. Przygotowany materiał przenieś na swoje stanowisko pracy.*

Uporządkuj stanowisko pracy. Traktuj wszystkie materiały i narzędzia użyte do zabiegu jako zakaźne.

Uzupełnij zamieszczoną w arkuszu dokumentację: *Kartę pacjenta, Opis postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym.* Sporządzając dokumenty w miejscu podpisu wpisz swój numer PESEL. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy,
- Karta pacjenta,
- Metryczka na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi,
- Opis postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

oraz

przebieg przygotowania roztworu środka dezynfekcyjnego, gotowego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi obrotowych i kapsułkowanego materiału glassjonomerowego.

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl

ULOTKA ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO
ID 212

Bezaldehydowy koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia instrumentarium ogólnego i chirurgicznego, jak również wrażliwych na związki zasadowe i alkohol instrumentów obrotowych.

- Nadzwyczajne działanie czyszczące
- Zastosowanie również w myjkach ultradźwiękowych
- 2,5 litra koncentratu daje 125 litrów roztworu użytkowego
- Ogromna oszczędność materiałów
- Łatwo ulegający biodegradacji
- W razie potrzeby szybko działający **(2%/5 min)**
- Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (wirusy osłonięte, adenowirusy nieosłonięte, HBV, HCV i HIV)
- Nowoczesna kombinacja substancji czynnych: alkylamina i czwartorzędowe związki amonowe
- Aktywny do 7 dni
- Bezpieczny dla alergików

Informacje o pacjencie przekazane w trakcie badania

Zęby:
- wypełnione 15, 26, 36, 45
- z próchnicą 16, 11, 21, 25, 34
- usunięte 24 i 46

Błona śluzowa bladoróżowa, gładka, lśniąca.
Przyzębie zdrowe.
Higiena dobra.
Pacjent ogólnie zdrowy.

Ząb 34 próchnica średnia klasa II dystalna (OD) do leczenia na dzisiejszej wizycie.

Polecenia lekarza dentysty

Proszę przygotować:

- *wiertło różyczkowe i walec diamentowy na kątnicę na mikrosilnik*
- *kątnicę na mikrosilnik*
- *upychadło kulkowe*
- *formówkę pierścieniową z założonym paskiem metalowym na ząb 34*
- *kapsułkowany materiał glassjonomerowy Riva Self Cure*

Po zabiegu proszę uzupełnić Kartę pacjenta uwzględniając Informacje o pacjencie przekazane w trakcie badania.

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl

KARTA PACJENTA

KLINIKA UŚMIECHU
ul. Miodowa 18, Skierniewice

Imię i nazwisko pacjenta: **Lidia Mechel**


Stan jamy ustnej

Błona śluzowa: ……

Przyzębie: ……

Higiena: ……

Choroby ogólnoustrojowe: ……



Legenda:

- – brak zęba
C – próchnica
W – wypełnienie
V – ząb lub korzeń do usunięcia
K – korona
~ – osad lub kamień nazębny

Data	Ząb	Rozpoznanie	Zabiegi	Podpis lekarza
…….	……	……..	…… …… ……	*Lek. stom.* *Jan Nowik*

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych

Metryczka na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi
…… …… …… …… Skład roztworu dezynfekcyjnego w mililitrach: Ilość wody: ……... Ilość preparatu: ……. Podpis …….

Opis postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym
W przypadku kontaktu ze skórą: …….. …… W przypadku kontaktu z okiem: ……..…… ……..……..

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl

ULOTKA MATERIAŁU RIVA SELF CURE

Riva Self Cure – chemoutwardzalny glassjonomer, widoczny w promieniach RTG, uwalniający fluor, z doskonałą adaptacją brzeżną oraz wytrzymałością na ściskanie. Preparat Riva ma szeroki zakres stosowania, dostępny jest w dwóch rodzajach: kapsułki (szybkowiążące i standardowe) w kolorach A1, A2, A3, A3.5, B2 i B3 oraz w systemie proszek/płyn w kolorach A1, A2, A3, A3.5, B2, B3.

Zastosowanie

- wypełnienia minimalnych ubytków klasy I, II
- wypełnienia ubytków w zębach mlecznych
- materiał podkładowy
- wykonywanie podbudowy pod prace protetyczne
- odbudowy powierzchniowe korzeni
- wypełnienia ubytków klasy V
- wypełnienia tymczasowe

Instrukcja używania Riva Self Cure w kapsułkach

Przygotowanie:
Oczyścić i odizolować poddany leczeniu ząb. Stosując techniki leczenia zachowawczego oraz odpowiednie instrumenty opracować ubytek. Podcięcia retencyjne nie są konieczne. Stosować techniki izolacyjne w celu zapobiegania infekcjom. Zaleca się użycie koferdamu. W przypadkach, gdzie ochrona miazgi jest konieczna użyć wodorotlenku wapnia.
Wskazówka: Powierzchnia powinna być nieco wilgotna

Aktywacja kapsułki:

- Aby spulchnić proszek, wstrząsnąć kapsułkę i postukać nią w twardą powierzchnię
- Wcisnąć końcówkę tłoczka kapsułki do momentu kiedy zrówna się on z korpusem kapsułki
- Umieścić kapsułkę w mieszalniku lub innym odpowiednim urządzeniu tego typu i mieszać przez **10 sekund**. Po ukończonym mieszaniu wyjąć kapsułkę z mieszalnika i następnie umieścić w pistolecie do aplikacji.

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl