

Nazwa
kwalifikacji:
Symbol
kwalifikacji:

Numer zadania:

Kod arkusza:

Wersja arkusza:

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

ROL.09

01

ROL.09-01-26.06-SG

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny <i>dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie</i>
R.1	Rezultat 1: Działania zapobiegawcze przeciwdziałające wybuchowi kiślicy – tabela 1.
	<i>Wpisane w kolumnie Prawda lub Fałsz w pozycji:</i>
R.1.1	Podkarmiać miodem pochodzącym z pasieki: fałsz
R.1.2	Wyrównywać siłę rodzin przez dokładanie plastrów z czerwem: fałsz
R.1.3	Tworzyć młode rodziny tylko metodą sztucznego roju: prawda
R.1.4	Przy poszerzaniu miodni używać tylko węzy: prawda
R.1.5	Ograniczać wymianę plastrów: fałsz
R.1.6	Obieg plastrów ograniczyć do jednej pasieki: prawda
R.1.7	Trzymać gniazdo luźno: fałsz
R.1.8	Zapobiegać rabunkom: prawda
R.1.9	Poszerzać gniazda pszczoły plastrami z pokarmem: fałsz
R.1.10	Odkazać ule i sprzęt pasieczny: prawda
R.2	Rezultat 2: Objawy kiślicy - tabela 2.
	<i>Wpisane w kolumnie Wyszczególnienie;</i>
	<i>Objawy kiślicy kwaśnej/czerwiu otwartego:</i>
R.2.1	Prześwitujące przez oskórek tchawki oraz skupiska barwy kremowo-żółtej bakterii w jelicie środkowym/matowe larwy/utrata połysku
R.2.2	Barwa ciała od żółtej po ciemnobrązową/zmiana w wyglądzie czerw
R.2.3	Obumarty czerw w komórkach
R.2.4	Wyczuwalny kwaśny/octu zapach/zmieniony zapach
	<i>Objawy kiślicy cuchnącej/czerwiu zasklepionego:</i>
R.2.5	Wieczka zasklepu czerw ciemne i zapadnięte/zmiana barwy czerw
R.2.6	Wygryzione przez pszczoły otworki z zasklepie czerw
R.2.7	Czerw o bezkształtnej masie, o zabarwieniu brudnożółtym/brunatnym
R.2.8	Czerw o gumistej konsystencji, daje się wyciągać, krótkie i grube nitki
R.2.9	Zapach gnijącego mięsa/cuchnący zapach
R.2.10	Ciemnobrązowe strupki, które łatwo usunąć z komórek/osłabiona rodzina
R.3	Rezultat 3: Czynności związane z przesiedleniem rodziny pszczoły na węzę - tabela 3.
	<i>Wpisane w kolumnie Etapy:</i>
R.3.1	Odebrane nadstawki z miodem
R.3.2	Odkazono ul/sprzęt
R.3.3	Przygotowane ramki z węzą
R.3.4	Umieszczona w klateczce matka pszczoły, zawieszona w przygotowanym ulu/transportówce/przeniesiona matka pszczoły
R.3.5	Odstawiony ul z rodziną obok albo z tyłu dawnego stanowiska
R.3.6	Ustawiony przygotowany ul/transportówka
R.3.7	Ułożony pomost przed wylotkiem ula/transportówki
R.3.8	Strząśnięte/zmiecone pszczoły na pomost z plastrów chorej rodziny/do ula
R.3.9	Usunięte plastry z chorej rodziny
R.3.10	Podany syrop na odbudowanie węzy
R.4	Rezultat 4: Sposoby dezynfekcji sprzętu pasiecznego – tabela 4.
	<i>Wpisane w kolumnie Czynności dezynfekcyjne; w pozycji</i>

R.4.1	Drewniany ul: oczyszczony z kitu i wosku/wypalony/wymyty sodą kaustyczną/środkiem dezynfekcyjnym
R.4.2	Metalowa krata odgradowa: oczyszczona z kitu i wosku/przemyta środkiem dezynfekcyjnym/alkoholem/opalona
R.4.3	Dłuto pasieczne: oczyszczone z wosku i kitu/przemyte środkiem dezynfekcyjnym/alkoholem/opalone
R.4.4	Szczotka pasieczna: spalona/wymyta w środku dezynfekcyjnym
R.4.5	Powałka: oczyszczona z kitu i wosku/wypalona/wymyta sodą kaustyczną/środkiem dezynfekcyjnym
R.4.6	Miodarka: wymyta/przemyta środkiem dezynfekcyjnym/alkoholem
R.4.7	Pomost: oczyszczony/wypalony/wymyty sodą kaustyczną/środkiem dezynfekcyjnym/spalony/
R.4.8	Nadstawka: oczyszczona z kitu i wosku/wypalona/wymyty sodą kaustyczną
R.5	Rezultat 5: Ilość potrzebnych materiałów do przesiedlenia rodzin pszczelich na węzę - tabela 5.
<i>Wpisane w kolumnie Ilość: w pozycji</i>	
R.5.1	Liczba arkuszy węzy na 1 rodzinę - 6 szt.
R.5.2	Ilość węzy dla całej pasieki - 7,5 kg
R.5.3	Liczba ramek wielkopolskich zbitych i zadrutowanych dla 1 rodziny - 6 szt.
R.5.4	Liczba ramek wielkopolskich zbitych i zadrutowanych dla 1 dla całej pasieki - 120 szt.
R.5.5	Ilość cukru na odbudowanie gniazda przez 1 rodzinę - 2,4 kg
R.5.6	Ilość cukru na odbudowanie gniazd przez wszystkie rodziny - 48 kg
R.5.7	Ilość syropu na 1 rodzinę - 3,84 l
R.5.8	Ilość syropu dla całej pasieki - 76,8 l lub liczba wynikająca z wcześniejszego błędnego wyliczenia
R.6	Rezultat 6: Wykaz zabiegów uprawowych pod uprawę gorzycy - tabela 6.
<i>Wpisane w kolumnach Rodzaj i Termin zabiegu:</i>	
R.6.1	Podorywka/talerzowanie, w kolumnie Termin zabiegu: po zbiorze jęczmienia ozimego/druga połowa lipca
R.6.2	Bronowanie, w kolumnie Termin zabiegu: po podorywce/druga połowa lipca
R.6.3	Nawożenie, w kolumnie Termin zabiegu: przed siewem/druga połowa lipca
R.6.4	Siew, w kolumnie Termin zabiegu: po nawożeniu/druga połowa lipca
R.6.5	Bronowanie, w kolumnie Termin zabiegu: po siewie/druga połowa lipca
R.6.6	Mulczowanie, ścięcie/przyoranie w kolumnie Termin zabiegu: po przekwitnięciu/jesienią/październik/listopad
R.6.7	Orka, w kolumnie Termin zabiegu: po mulczowaniu/jesienią/październik/listopad